

ปกิณกะ

พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)

คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา*

hypercorticalism ภาวะเนื้อต่อมหมวกไตชั้นนอกทำงานเกิน น. คมม. *hyperadrenocorticism, hypercorticism*

hypercorticism คมม. *hyperadrenocorticism, hypercorticism*

hypercreatinemia ภาวะเลือดมีครีเอตินีนเกิน น. การมีครีเอตินีนในเลือดมากผิดปกติ เกิดจากการแปรรูปอนุครีเอตินีนในกล้ามเนื้อลายผิดปกติ เป็นลักษณะที่พบบ่อยของโรคต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ

hypercryalgnesia ภาวะรู้สึกเย็นเกิน น. ความรู้สึกต่ออุณหภูมิเย็นไวมากผิดปกติ คมม. *hypercryesthesia*

hypercryesthesia คมม. *hypercryalgnesia*

hypercupremia ภาวะเลือดมีทองแดงเกิน น. การมีทองแดงมากผิดปกติในเลือด ทำให้ภาวะทองแดงเป็นพิษ

hypercupriuria ภาวะปัสสาวะมีทองแดงเกิน น. การมีทองแดงขับออกมาในปัสสาวะมากผิดปกติ พบในภาวะทองแดงเป็นพิษ และโรควิลสัน คมม. *cupriuria, cupruresis*

hypercyanotic -สภาพเขียวคล้ำเกิน ว. เกี่ยวกับผิวและเยื่อเมือกเขียวคล้ำมากเนื่องจากเลือดขาดออกซิเจน เป็นสีของฮีโมโกลบินพร่องออกซิเจน

hypercyesis การปฏิสนธิซ้อน น. การผสมพันธุ์เพิ่มขณะมีทารกในครรภ์อยู่แล้ว เกิดจากวงจรตกไข่คนละวงจร ทำให้เกิดทารกในครรภ์ต่างอายุหลายตัว คมม. *superfetation*

hypercythemia ภาวะเลือดมีเม็ดเลือดแดงเกิน น. จำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติในเลือด คมม.

erythrocytemia, erythrocythemia, hypererythrocytemia, polycythemia

hypercytichromia ภาวะเซลล์ติดสีเกิน น. เม็ดเลือดแดงติดสีมากกว่าปกติ

hyperdactylia ภาวะนิ้วเกิน น. การมีนิ้วมือหรือนิ้วเท้ามากกว่าปกติ เป็นวิกลรูปแบบหนึ่ง คมม. *hyperdactyly, polydactylism, polydactyly*

hyperdactyly คมม. *hyperdactylia, polydactylism, polydactyly*

hyperdicrotism ภาวะชีพจรสองจังหวะเกิน น. ลักษณะบันทึกพบชีพจรจังหวะคู่บ่อยผิดปกติ

hyperdiuresis ภาวะถ่ายปัสสาวะเกิน น. การถ่ายปัสสาวะมากผิดปกติ

hyperdontia ภาวะฟันเกิน น. จำนวนฟันมากกว่าปกติ คมม. *polyodontia*

hyperdynamia ภาวะพลังเกิน น. คมม. *hyperactivity* ความหมายที่ ๑

hyperdynamia uteri ภาวะพลังมดลูกเกิน น. มดลูกบีบตัวมากเกินไปในระยะคลอด

hypereccrisia การขับออกเกิน น. การขับสารออกจากร่างกายมากผิดปกติ คมม. *hypereccrisis*

hypereccrisis คมม. *hypereccrisia*

hyperekplexia ภาวะตกใจเกิน น. การมีปฏิกิริยาผวาบ่อยผิดปกติแต่กำเนิด ในทารกมีกลุ่มอาการร่วมกับภาวะกล้ามเนื้อตึงตัวเกิน เคลื่อนไหวน้อย และปฏิกิริยาตอบสนองสมองรวดเร็ว ในผู้ใหญ่มีอาการคล้ายบ้าจี้ คมม. *hyperexplexia, startle disease*

*ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ ประธานกรรมการ, ศ.นพ.ก้องเกียรติ ภูณท์กันทรารกร กรรมการ, รศ.พญ.จันทพงษ์ วะสี กรรมการ, ศ.ทพญ.ใจนุช จงรักษ์ กรรมการ, ศ.พญ.ฉวีวรรณ บุนนาค กรรมการ, นพ.ทองดี ชัยพานิช กรรมการ, ศ.คลินิก พญ.คุณไชวดี ดุลยจินดา กรรมการ, น.ส.บุญธรรม กรานทอง กรรมการ, รศ.ดร.ปริยา สีนหกุล กรรมการ, ศ.นพ.ดร.เรื่อน สมณะ กรรมการ, รศ.พญ.วาณี วิสุทธิ์เสริวงศ์ กรรมการ, ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤติยาคามิ กรรมการ, ผศ.นพ.เอกชัย โค้ววิสารัช กรรมการ, ผศ.นพ.ปานเทพ สุทธิพันธ์ กรรมการ, ผศ.ดร.สพญ.ศิริวรรณ พราพงศ์ กรรมการ, ศ.นพ.สุรศักดิ์ บุณดรีเวทย์ กรรมการ, รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์ กรรมการ, พอ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม กรรมการ, รศ.ภญ.อรลักษณ์า แพร่ตกุล กรรมการ, ศ.นพ.วิเชียร เลหาเจริญสมบัติ กรรมการ, นพ.สมเกียรติ ลีละศิริ กรรมการ, น.ส.สมทรง ศกุนตนาถ กรรมการและเลขานุการ, น.ส.อัญญา ไพจิตรหทัย กรรมการและรองเลขานุการ

hyperelasticity สภาพยืดหยุ่นเกิน น. มีความยืดหยุ่นมากเกินไปกว่าปกติ เช่น ที่พบในภาวะหนังหยาบและกลุ่มอาการเอห์เลอร์ส-แดนโลส

hyperelectrolytemia ภาวะเลือดมีอิเล็กโทรไลต์เกิน น. การมีอิเล็กโทรไลต์ในเลือดมากเกินไป

hyperemesis ภาวะอาเจียนเกิน น. การอาเจียนมากผิดปกติ
hyperemesis gravidarum ภาวะอาเจียนเกินเหตุมีครรภ์ น. การที่หญิงตั้งครรภ์มีอาการอาเจียนรุนแรงมักเป็นเวลาเช้า

hyperemesis lactentium ภาวะสำรอกนมเกิน น. การที่ทารกกินนมแล้วแหวะมาก

hyperemia ภาวะเลือดคั่งเฉพาะแห่ง น. การมีเลือดเพิ่มขึ้นในส่วนหนึ่งของร่างกาย คมม. *engorgement*

active hyperemia ภาวะเลือดคั่งกัมมันต์ น. การมีเลือดเพิ่มในส่วนหนึ่งของร่างกายเหตุหลอดเลือดฝอยคลายตัว คมม. *arterial hyperemia, fluxionary hyperemia*

arterial hyperemia ภาวะเลือดคั่งเหตุหลอดเลือดแดง น. คมม. *active hyperemia, fluxionary hyperemia*

collateral hyperemia ภาวะเลือดคั่งเฉพาะแห่งเหตุหลอดเลือดเปี่ยง น. การที่เลือดไหลเวียนเพิ่มขึ้นผ่านหลอดเลือดที่เกิดขึ้นใหม่ เมื่อเลือดไหลผ่านหลอดเลือดเดิมไม่ได้

exercise hyperemia ภาวะเลือดคั่งเฉพาะแห่งเหตุออกกำลังกาย น. การมีหลอดเลือดฝอยในกล้ามเนื้อขยายตัวเมื่อเริ่มต้นออกกำลังกาย เป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงกล้ามเนื้อหดตัว

fluxionary hyperemia คมม. *active hyperemia, arterial hyperemia*

passive hyperemia ภาวะเลือดคั่งเฉพาะแห่งอุนพัทธ์ น. การที่เลือดเพิ่มในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เกิดจากการอุดตันเลือดไหลออกจากบริเวณไม่ได้ คมม. *venous hyperemia*

reactive hyperemia ภาวะเลือดคั่งเฉพาะแห่งฟื้นสภาพ น. การมีเลือดเพิ่มขึ้นในส่วนหนึ่งของร่างกายหลังจากหยุดไหลเวียนชั่วคราว

hypereosinophilia ภาวะเลือดมีอีโอซิโนฟิลเกิน น. การมีเซลล์เม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟิลจำนวนมากผิดปกติในเลือด

filarial hypereosinophilia ภาวะเลือดมีอีโอซิโนฟิลเกินเหตุพยาธิฟิลาเรีย น. การมีอีโอซิโนฟิลมากเกินไปผิดปกติในเลือดเนื่องจากมีตัวอ่อนพยาธิฟิลาเรีย คมม. *tropical pulmonary eosinophilia*

hyperepinephrinemia ภาวะเลือดมีเอพิเนพรินเกิน น. การมีเอพิเนพรินมากเกินไปผิดปกติในเลือด พบในผู้ป่วยฟีโอโครโมไซโตมา

hyperequilibrium ภาวะสมดุลเกิน น. การมีแนวโน้มเกิดอาการวิงเวียน

hyperergia ภาวะทำงานเกิน น. การไวเกินต่อการเกิดภูมิแพ้เพิ่มขึ้น

hypererythrocythemia คมม. *erythrocythemia, hypercythemia, polycythemia*

hyperesthesia ภาวะรับรู้สีกเกิน น. การมีความรู้สึกมากขึ้นผิดปกติ

acoustic hyperesthesia คมม. *auditory hyperesthesia, hyperacusis*

cerebral hyperesthesia ภาวะรับรู้สีกเกินเหตุสมอง น. การรู้สึกเจ็บเกินจริงเนื่องจากรอยโรคในสมองใหญ่

gustatory hyperesthesia ภาวะรับรู้สีกรสเกิน น. ความรับรู้สีกรสไวเพิ่มขึ้น คมม. *hypergeusia, hypergeusia*

muscular hyperesthesia ภาวะรับรู้เกินกล้ามเนื้อ น. การที่กล้ามเนื้อไวมากเกินไปผิดปกติต่อความรู้สึกเจ็บปวดหรืออ่อนแรง

olfactory hyperesthesia ภาวะรับรู้กลิ่นเกิน น. การรับรู้กลิ่นไวขึ้นมาก คมม. *hyperosmia*

oneiric hyperesthesia ภาวะรับรู้สีกเกินขณะฝัน น. ความรับรู้หรือความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นผิดปกติขณะฝัน

optic hyperesthesia ภาวะรับรู้เกินการเห็นและแสง น. การที่ตารู้สีกไวผิดปกติต่อแสง คมม. *abnormal sensitivity of the eye to light*

tactile hyperesthesia ภาวะรับรู้เกินการสัมผัส น. การรับรู้ต่อการสัมผัสไวมากขึ้น คมม. *hyperaphia*

hyperestrogenism ภาวะเอสโตรเจนเกิน น. การมีฮอร์โมนเพศหญิงมากเกินไปผิดปกติในร่างกาย คมม. *hyperestrogenosis*

hyperestrogenosis คมม. *hyperestrogenism*

hyperexcitability ภาวะเร้าได้เกิน น. การเกิดการเร้าได้มากผิดปกติ *คมม. hyperirritability*

peripheral nerve hyperexcitability ภาวะเร้าเส้นประสาทส่วนรอบมากผิดปกติ น. การที่เส้นประสาทส่วนรอบไวรับการเร้ามากเกินไปจนเกิดอาการกล้ามเนื้อที่ประสาทเส้นนั้นไปเลี้ยง เช่น อาการตะคริว แข็งเกร็ง และกล้ามเนื้อตึงตัว

hyperexcretory -หลังเกิน ว. มีการคัดหลั่งมากเกินไปจนผิดปกติ

hyperplexia *คมม. hyperekplexia*

hyperextension ภาวะเหยียดเกิน น. การที่แขนขาหรือส่วนอื่นของร่างกายเหยียดเกินปกติ

hyperferremia ภาวะเลือดมีเหล็กเกิน น. การมีเหล็กในเลือดมากผิดปกติ *คมม. hyperferricemia, siderosis* ดู *iron poisoning* ประกอบ

hyperferricemia น. *คมม. hyperferremia, hyperferricemia, siderosis*

hyperfibrinogenemia *คมม. fibrinogenemia*

hyperfiltration ภาวะกรองเกิน น. การมีอัตราการกรองของหน่วยไตเพิ่มขึ้น มักเป็นสัญญาณแรกบอกการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ ๑

hyperflexion ภาวะคู้เกิน น. การที่แขนขาหรือส่วนของร่างกายงอ ต้านแรงผืนได้มากเกินไป

hyperfractionation การแบ่งส่วนมากเกินไป น. การแบ่งตารางการให้รังสีรักษาบ่อยลง โดยลดขนาดรังสีที่ให้แต่ละครั้ง แต่ขนาดการรักษาเท่าเดิม ลดผลข้างเคียงจากการให้รังสีรักษา *คมม. hyperfractionated radiotherapy*

hyperfunction การทำหน้าที่เกิน น. การทำงานของอวัยวะมากกว่าปกติ

hypergalactia ภาวะหลังน้ำนมเกิน น. การมีน้ำนมออกมากกว่าปกติ *คมม. hypergalactosis*

hypergalactosis *คมม. hypergalactia*

hypergammaglobulinemia ภาวะเลือดมีแกมมาโกลบูลินเกิน น. การมีแกมมาโกลบูลินในเลือดมากกว่าปกติ มักพบในผู้ป่วยโรคติดต่อเรื้อรัง

monoclonal hypergammaglobulinemia ภาวะเลือดมีแกมมาโกลบูลินเกินเหตุเซลล์ต้นพันธุกรรมเหมือนเดียว น. พบในผู้ป่วยมะเร็งเซลล์พลาสมาชนิดที่เซลล์เจริญเพิ่มจำนวนเป็นสำเนาจากเซลล์พลาสมาเซลล์เดียว สร้างอิมมูโนโกลบูลินเอ็ม เซลล์มีรูปร่างเป็นเซลล์

พลาสมา หรืออาจมีรูปร่างคล้ายลิมโฟไซต์ หรือผสมกัน โรคในกลุ่มนี้ ได้แก่ มัลติเพิลไมอีโลมา (multiple myeloma) วาลเดนสตรอมแมโครโกลบูลินเมีย *คมม. dysproteinemia, immunoglobulinopathy, monoclonal gammopathy, paraproteinemia, plasma cell dyscrasia*

polyclonal hypergammaglobulinemia ภาวะเลือดมีแกมมาโกลบูลินหลายชนิด น.

hypergeusesthesia ภาวะรับรู้รสเกิน น. การมีความไวรับรู้รสผิดปกติ *คมม. gustatory hyperesthesia, hypergeusia*

hypergeusia *คมม. gustatory hyperesthesia, hypergeusesthesia*

hyperglandular -ต่อมกัมมันตภาพเกิน ว. เกี่ยวกับต่อมที่ทำงานมากผิดปกติ

hyperglobulinemia ภาวะเลือดมีโกลบูลินเกิน น. เลือดมีโกลบูลินมากผิดปกติ

hyperglucagonemia ภาวะเลือดมีกลูคากอนเกิน น. เลือดมีกลูคากอนมากผิดปกติ

hyperglycemia ภาวะเลือดมีน้ำตาลเกิน น. เลือดมีระดับน้ำตาลสูงผิดปกติ

rebound hyperglycemia ภาวะเลือดมีน้ำตาลเกินย้อน น. ปรากฏการณ์สะท้อนกลับที่พบในผู้ป่วยเบาหวาน เมื่อได้รับอินซูลินมากเกินไปจนเกิดภาวะเลือดขาดน้ำตาล กระตุ้นการหลั่งเอพิเนฟริน คอร์ติโคโทรปิน กลูคากอน และฮอร์โมนกระตุ้นการเติบโต ทำให้เกิดการสลายไขมัน สร้างกลูโคสใหม่ และสลายกลัยโคเจน ทำให้เลือดมีกลูโคสสูงเกิน *คมม. Somogyi effect, Somogyi phenomenon*

hyperglyceridemia ภาวะเลือดมีกลีเซอไรด์เกิน น. การมีกลีเซอไรด์ในเลือดมากเกินไปผิดปกติ มักเป็นไตรกลีเซอไรด์

hyperglycerolemia ภาวะเลือดมีกลีเซอรอลเกิน น.

- พบในผู้ป่วยโรคเอนไซม์กลีเซอรอลโคเนส พันธุกรรม ที่มีการสะสมและขับกลีเซอรอลเนื่องจากพร่องเอนไซม์กลีเซอรอลโคเนส เกิดจากการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมกลีเซอรอลโคเนส ซึ่งเชื่อมกับโครโมโซมเอ็กซ์ มีอาการ ๓ แบบ (๑) แบบทารกพบร่วมกับภาวะกล้ามเนื้อเจริญเพี้ยนดูเซนน์ และต่อมหมวกไตไม่เจริญแต่กำเนิด; (๒) แบบวัยรุ่นมีอาการครึ่งคราว คือ อาเจียน ภาวะเลือดเป็นกรด

เหตุการณ์แปรปรวนซึม และไม่รู้สึกตัว; (๓) แบบผู้ป่วยมักไม่แสดงอาการ

๒. การมีเกล็ดเลือดรอลมากเกินในเลือด

hyperglycinemia คมม. *glycinemia*

ketotic hyperglycinemia ภาวะเลือดมีกลัยซีนเกินร่วมภาวะพิษคีโตน น. การที่เลือดสะสมและขับกลัยซีนเพิ่มขึ้นร่วมกับภาวะพิษคีโตน เกิดขึ้นหลังภาวะเลือดมีกรดไพรูวอโนค กรดเมธิลเมโลนิค และกรดอินทรีย์อื่น ๆ มากเกินปกติ

non-ketotic hyperglycinemia ภาวะเลือดมีกลัยซีนเกินไร้คีโตน น. โรคกรดแอมิโนเหตุพันธุกรรมเกิดจากการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมกายด้อยเป็นเหตุให้ระบบเอนไซม์ย่อยกลัยซีนเสียลักษณะโรค คือ กลัยซีนสะสมในสารน้ำของร่างกาย โดยเฉพาะเลือด ปัสสาวะ และสารน้ำหล่อสมองไขสันหลัง แบบที่พบบ่อยคือ พบในทารกแรกคลอดอาการอ่อนเพลีย สมองใหญ่ไม่พัฒนา ชัก กล้ามเนื้อกระตุก ไม่รู้สึกตัว และหายใจล้มเหลว แบบที่เกิดขึ้นภายหลังจะมีอาการอ่อนกว่าอาจพบชั่วเวลาหนึ่งในระยะแรกคลอดแล้วกลับเป็นปกติเมื่ออายุ ๘ สัปดาห์ มักไม่มีความผิดปกติของระบบประสาท อาจพบอาการปัญญาอ่อนได้ คมม. *glycine encephalopathy*

hyperglycinuria ภาวะปัสสาวะมีกลัยซีนเกิน น. การมีกรดแอมิโนที่ประกอบด้วยกลัยซีนมากในปัสสาวะ

hyperglycogenolysis ภาวะสลายกลัยโคเจนเกิน น. การมีกลัยโคเจนแยกตัวมากเกินไป เป็นผลให้มีกลูโคสมากในร่างกาย

hyperglycorrachia ภาวะสารน้ำหล่อไขสันหลังมีน้ำตาลเกิน น. สารน้ำหล่อไขสันหลังมีกลูโคสเกินปกติ

hyperheparinemia ภาวะเลือดมีเฮปารินเกิน น. การมีเฮปารินในเลือดมากผิดปกติ ทำให้ลิ่มเลือดจับตัวช้าและตกเลือด

hyperhidrosis ภาวะเหงื่อเกิน น. การมีเหงื่อหลั่งออกมาก คมม. *hyperidrosis, polyhidrosis*

axillary hyperhidrosis ภาวะเหงื่อเกินที่รักแร้ น. การมีเหงื่อออกมากเฉพาะบริเวณรักแร้เหตุอารมณ์

compensatory hyperhidrosis ภาวะเหงื่อเกินชดเชย น. การมีเหงื่อออกมากที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อทดแทนต่อมเหงื่อบริเวณใกล้เคียงที่ถูกทำลายและไม่ทำงาน

emotional hyperhidrosis ภาวะเหงื่อเกินเหตุอารมณ์ น. การมีเหงื่อออกมากเหตุอารมณ์ เป็นความผิดปกติของต่อมเหงื่อเอกริน เกิดจากหน่วยพันธุกรรมกายเด่นผิดปกติ มักมีเหงื่อออกที่ฝ่ามือฝ่าเท้า และรักแร้ เมื่อถูกกระตุ้นทางอารมณ์หรือวิตกกังวล บางครั้งพบว่าการกระตุ้นทางจิตใจหรือความรู้สึกทำให้เหงื่อออกที่รักแร้หรือฝ่ามือฝ่าเท้าแห่งใดอย่างหนึ่ง

gustatory hyperhidrosis ภาวะเหงื่อเกินเหตุรส น. การมีเหงื่อออกมากขณะกินอาหารได้รับรูรส บางรส คมม. *auriculotemporal syndrome, gustatory sweating*

palmar hyperhidrosis ภาวะเหงื่อเกินฝ่ามือ น. การมีเหงื่อออกมากบริเวณฝ่ามือ ขณะเกิดอารมณ์

palmoplantar hyperhidrosis ภาวะเหงื่อเกินฝ่ามือฝ่าเท้า น. การมีเหงื่อออกมากที่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าเมื่อเกิดอารมณ์ คมม. *volar hyperhidrosis*

plantar hyperhidrosis ภาวะเหงื่อเกินฝ่าเท้า น. การมีเหงื่อออกมากบริเวณฝ่าเท้าขณะเกิดอารมณ์

unilateral hyperhidrosis ภาวะเหงื่อเกินซีกเดียว น. การมีเหงื่อออกมากที่ร่างกายซีกใดซีกหนึ่ง คมม. *hyperhidrosis unilateralis*

volar hyperhidrosis ภาวะเหงื่อเกินฝ่ามือฝ่าเท้า น. ดู palmoplantar hyperhidrosis

hyperhidrosis ภาวะเหงื่อเกิน น. ดู *hyperhidrosis*

hyperhidrosis unilateralis ภาวะเหงื่อเกินซีกเดียว น. ดู *unilateral hyperhidrosis*

hyperhydration ภาวะน้ำเกิน น. การมีสารน้ำมากเกินไปในร่างกาย คมม. *overhydration*

hyperhydrochloia คมม. *hyperchlorhydria*

hyperhydrochloridia คมม. *hyperchlorhydria, hyperhydrochloia*

hyperimmune - ภูมิคุ้มกันเกิน ว. เกี่ยวกับการมีสารภูมิต้านทานจำเพาะปริมาณสูงมากในซีรัม

hyperimmunity ภาวะภูมิคุ้มกันเกิน น. การมีสารภูมิต้านทานจำเพาะระดับสูงเนื่องจากได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันมากเกินไป

hyperimmunization การสร้างภูมิคุ้มกันเกิน น. กระบวนการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้ได้สารภูมิต้านทานระดับสูงในกระแสเลือด มักเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์หรือผู้บริจาคเลือดโดยการ

ให้สารก่อภูมิคุ้มกันหลายครั้งเพื่อนำเลือดมาผลิตซีรัมที่มีสารภูมิคุ้มกันจำเพาะหรืออิมมูโนกลอบูลิน

hyperimmunoglobulinemia ภาวะเลือดมีอิมมูโนกลอบูลินเกิน น. การมีอิมมูโนกลอบูลินระดับสูงผิดปกติในซีรัม

hyperinflation การพองลมเกิน น. การมีลมมากหรือขยายมาก ดังที่พบในปอด คมม. *overinflation*

hyperingestion การบริโภคเกิน น. การบริโภคสารอาหารมากเกินไป

hyperinsulinemia ภาวะเลือดมีอินซูลินเกิน น. การมีอินซูลินระดับสูงมากในเลือด

hyperinsulinism ภาวะอินซูลินเกิน น. ๑. การมีอินซูลินคั่งหลังมากเกินจากตับอ่อน ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ๒. ภาวะซ็อกอินซูลิน ๓. ภาวะเลือดมีอินซูลินมากเกินไป

hyperinvolution ภาวะมดลูกลดขนาดเกิน น. การที่มดลูกลดขนาดลงหลังคลอดจนเล็กกว่าปกติ พบในมารดาที่ให้นมบุตร คมม. *super involution*

hyperiodemia ภาวะเลือดมีไอโอดีนเกิน น. การมีไอโอดีนในเลือดมาก

hyperirritability สภาพหงุดหงิดง่ายเกิน น. ความรู้สึกไวต่อการถูกรบกวน หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย

hyperkalemia ภาวะเลือดมีโพแทสเซียมเกิน น. การมีโพแทสเซียมในเลือดระดับสูงเกินปกติ มักเกิดจากการขับโพแทสเซียมของไตเสีย บันทึกลิ้นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ ในรายที่อาการรุนแรงจะพบกล้ามเนื้ออ่อนแรงตามด้วยอัมพาตปากเปื่อย คมม. *hyperkalemia hyperpotassemia, potassemia*

hyperkaliemia คมม. *hyperkalemia*

hyperkeratinization การผลิตเคอราตินเกิน น. การสร้างเคอราตินมาก มีการสะสมมาก เช่น ที่หนัง

hyperkeratosis ภาวะเคอราตินเกิน น. มีเคอราตินสะสมที่หนังชั้นสตราตัมคอร์เนียมากเกินไป ดู *callus, keratosis* ประกอบ

epidermolytic hyperkeratosis ภาวะเคอราตินเกินเหตุหนึ่งกำพริสลาย น. โรคผิวหนังเกิดจากการสร้างเคอราตินผิดปกติเนื่องจากมีการกลายพันธุ์ของหน่วยพันธุกรรมทำให้โครงสร้างของโทโนไฟบริลเสีย พบอาการโรคตั้งแต่เกิด มีหนังแดงทั่วตัวและผิวหนังมาก ผิวทั่วตัวปกคลุมด้วยสะเก็ดขรุขระ เป็นมากบริเวณข้อพับ

ฝ่ามือ และฝ่าเท้าเป็นรอยย่น ลักษณะสำคัญในวัยทารกและเด็ก คือ พบเม็ดน้ำขนาดใหญ่เป็น ๆ หาย ๆ เกิดครั้งแรกที่ขา; โรคคักแด่ ก็เรียก

focal acral hyperkeratosis ภาวะเคอราตินเกินเป็นหย่อมที่มือและเท้า น. โรคผิวหนังที่พบปุ่มแข็งบนมือและเท้า พบไม่บ่อย

follicular hyperkeratosis ภาวะเคอราตินเกินปุ่ม น. โรคหนังหนาที่ชุมชน เกิดเป็นปุ่มหนามหยาบบริเวณรูเปิดที่มีก้อนไขมันสีขาวอยู่ สาเหตุร่วมคือ ขาดวิตามินเอ อี บีรวม และกรดไขมันสำคัญ โรคหนังคางคก ก็เรียก คมม. *phrynoderma, toad skin*

hyperkeratosis follicularis in cutempenetrans ภาวะเคอราตินเกินปุ่มทะลุผิว น. โรคผิวหนังเรื้อรังที่พบไม่บ่อย ลักษณะสำคัญคือ มีปุ่มหนามประกอบด้วยเคอราตินและเศษเซลล์ มักพบเซลล์ขนาดใหญ่ในรอยโรค ปุ่มมักอยู่แยกกันหรือรวมกันเป็นปื้นหนาหรือแผ่น มีอาการเจ็บ คมม. *hyperkeratosis follicularis et parafollicularis in cutempenetrans, hyperkeratosis penetrans, Kyrle disease*

hyperkeratosis follicularis et parafollicularis in cutempenetrans ดู *hyperkeratosis follicularis in cutempenetrans*

hyperkeratosis lacunaris ภาวะเคอราตินเกินชนิดแอ่ง น. โรคที่พบก้อนแข็งสีขาวยื่นจากต่อมทอนซิลและรูเปิดของปุ่มน้ำเหลืองที่ผนังคอหอย คมม. *keratosis pharynx*

hyperkeratosis lenticularis perstans ภาวะเคอราตินเกินหนังหนา น. โรคหนังหนาเกินที่พบไม่บ่อยในผู้ที่มีอายุ ๓๐ - ๔๐ ปี เกิดจากพันธุกรรมกายลักษณะเด่นผิดปกติ ลักษณะสำคัญคือ ผิวหนา สีจาง มีปุ่มสะเก็ดที่ขา บางครั้งพบที่ลำตัว ต้นขา หรือแขน มักพบร่วมกับผิวหนังเป็นจุดเล็ก ๆ ที่ฝ่ามือฝ่าเท้า คมม. *Flegel disease*

hyperkeratosis palmaris et plantaris ภาวะเคอราตินเกินฝ่ามือฝ่าเท้า น. กลุ่มโรคหนังหนามีลักษณะสำคัญคือ มีเคอราตินสะสมที่ฝ่ามือฝ่าเท้า แบบเฉพาะที่หรือแผ่กว้าง บางครั้งรู้สึกเจ็บเพราะหนังแตก อาจเกิดเป็นโรคเดียวหรือเป็นอาการร่วมกับความผิดปกติอื่น ส่วนใหญ่เป็นโรค

กรรมพันธุ์ *ค.ม. hyperkeratosis palmoplantaris, hyperkeratosis of palms and soles, keratodermopalmare et plantare, palmopantar hyperkeratosis*

hyperkeratosis penetrans ภาวะเคราตินเกินทะลุผิว น. ดู *hyperkeratosis follicularis in cutempenetrans*

progressive dystrophic hyperkeratosis ภาวะเคราตินเกินโภชนาการเพี้ยนชนิดลุกลาม น. โรคหนังหนาเกินที่ฝ่ามือฝ่าเท้าซึ่งมีมีอาการลุกลาม เริ่มเป็นตั้งแต่เด็ก ผิวหนาแบบรูปดาวหรือเป็นกลุ่มที่หลังมือหลังเท้า ผิวหนาเป็นเส้นที่ศอกและเข่า เป็นวงแหวนพันรัดนิ้ว บางรายมีผื่นร่วงจากรอยแผลเป็นและหูหนวก เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมกายลักษณะเด่น *ค.ม. keratoderma, keratoma hereditarium mutilans, Vohwinkel syndrome*

subungual hyperkeratosis ภาวะเคราตินเกินใต้เล็บ น. โรคหนังหนาที่เกิดกับผิวหนังใต้เล็บ *ค.ม. hyperkeratosis subungualis*

hyperkeratosis of palms and soles ภาวะเคราตินเกินฝ่ามือฝ่าเท้า น. *ค.ม. hyperkeratosis palmaris et plantaris*

hyperkeratosis subungualis *ค.ม. subungual hyperkeratosis*

hyperkertos palmopantar *ค.ม. hyperkeratosis palmaris et plantaris*

hyperketonemia ภาวะเลือดมีคีโตนเกิน น. การมีคีโตนมากเกินไปในเลือด พบในภาวะอดอาหาร และเบาหวาน *ค.ม. ketonemia*

hyperketonuria ภาวะปัสสาวะมีคีโตนเกิน น. การมีคีโตนมากเกินไปในปัสสาวะ พบในโรคเบาหวาน *ค.ม. acetonuria, ketonuria*

hyperketosis ภาวะคีโตนเกิน น. การมีคีโตนมากผิดปกติในร่างกาย พบในภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ภาวะอดอาหาร และโรคพิษสุรา *ค.ม. ketosis*

hyperkinemia ภาวะเลือดไหลเวียนเกิน น. การมีเลือดออกจากหัวใจมากเกินไปผิดปกติ อัตราเลือดไหลเวียนในระบบเพิ่มขึ้น

hyperkinesia ภาวะกัมมันต์เกิน น. ดู *hyperactivity*

hyperkinesis *ค.ม. hyperactivity*

hyperlactacidemia ภาวะเลือดมีกรดแลคติกเกิน น. การมีกรดแลคติกมากเกินไปในเลือด

hyperlactation การหลั่งน้ำนมเกิน น. การมีน้ำนมมากกว่าปกติหรือนานกว่าระยะเวลาปกติ

hyperlecithinemia ภาวะเลือดมีเลซิธินเกิน น. การมีเลซิธินมากเกินไปในเลือด

hyperleukocytosis ภาวะเม็ดเลือดขาวเกิน น. การมีเม็ดเลือดขาวจำนวนมากเกินปกติ เช่น ในมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด

